









Инструкция по применению фунгицида «Азофос»

Норма расхода препарата	Культура, обрабатываемые объекты	Заболевание	Способ, время обработки, ограничения	Кратность, в скобках – срок выхода людей после обработки (сутки)	Срок последней обработки (в днях до сбора урожая)
100-150 мл на 10 л воды (на 100 м ²)	 <p>Картофель</p>	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости на 100 м ² .	3 (3)	20
100-150 мл на 10 л воды (на 100 м ²)	 <p>Томат закрытого грунта</p>	Фитофтороз, альтернариоз, бурая пятнистость, бактериоз	Опрыскивание в период вегетации.	2 (3)	8
150 мл на 10 л воды (на 100 м ²)	 <p>Огурец закрытого грунта</p>	Бурая пятнистость	То же	2 (3)	5
8 мл на 10 л воды 100-120 мл	 <p>Яблоня</p>	Парша	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: молодые деревья (до 6 лет) – до 2 л на дерево, плодоносящие деревья – до 10 л на дерево.	2 (3)	20
100 мл на 10 л воды	 <p>Слива, вишня, алыча</p>	Монилиоз, коккомикоз, кластероспориоз	То же	4 (3)	20
100 мл на 10 л воды	 <p>Смородина</p>	Септориоз, антракноз	Опрыскивание в период вегетации: первое – выдвижение цветочных кистей; второе – сразу после цветения; третье – после сбора урожая.	3 (3)	25
100 мл на 10 л воды	 <p>Брусника</p>	Комплекс болезней стеблей и плодов	Опрыскивание в период вегетации.	1 (3)	70
100 мл на 10 л воды	 <p>Клюква крупноплодная</p>	Гиббера, фомопсис	То же	1 (3)	70